

# Guía del GETH para el Diagnóstico y Tratamiento de la Aplasia Medular

Fe de erratas (21-10-19)

## Página 31

Donde dice:

La dosis inicial recomendada de eltrombopag es 50 mg una vez al día. Para pacientes con ascendencia del este asiático, el tratamiento con eltrombopag debe iniciarse a una dosis reducida de 25 mg una vez al día. **Evaluar respuesta cada dos semanas e incrementar la dosis 25 mg/día hasta alcanzar respuesta, nunca superando la dosis total de 150 mg/día**<sup>43</sup>.

Debe decir:

La dosis inicial recomendada de eltrombopag es **50 mg una vez al día**. Para pacientes con ascendencia del este asiático, el tratamiento con eltrombopag debe iniciarse a una dosis reducida de 25 mg una vez al día. **Se debe ajustar la dosis de eltrombopag con incrementos de 50 mg cada 2 semanas hasta alcanzar recuentos de plaquetas  $\geq 50.000/\mu\text{l}$ . En pacientes que toman 25 mg una vez al día, primero se debe aumentar la dosis a 50 mg al día antes de aumentar la dosis con incrementos de 50 mg. No se debe sobrepasar la dosis de 150 mg al día**<sup>43</sup>.

## Página 30

Donde dice:

Premedicación: treinta minutos antes de la administración de ATG y a las 6 horas del inicio si continua con la perfusión, se debe administrar:

- u Dexclorfeniramina 5 mg iv días +1 a +4
- u Paracetamol 1 g iv días +1 a +4
- u Metilprednisolona (Urbason®) 1 mg/kg iv día +1 a +4

Debe decir:

Premedicación: treinta minutos antes de la administración de ATG y a las 6 horas del inicio si continua con la perfusión, se debe administrar:

- u Dexclorfeniramina 5 mg iv días +1 a +5
- u Paracetamol 1 g iv días +1 a +5
- u Metilprednisolona (Urbason®) 1 mg/kg iv día +1 a +5